

ANILLAMIENTO DE PAPAMOSCAS PAPIRROJO (*Ficedula parva*) EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Miguel Domínguez (SEO-Málaga, Málaga)

Urb. Balcón de Málaga 94. 29720 Rincón de la Victoria (Málaga). migueldominguez@seomalaga.org

INTRODUCCIÓN

Durante una sesión de anillamiento el 15 de octubre de 2006, fue capturado en el río Guadalmedina, Casabermeja (Málaga), un ejemplar de papamoscas papirojo (*Ficedula parva*) en plumaje de primer invierno. En esta nota se describe el ave y se comenta su identificación

La identificación de este individuo es provisional en tanto no sea publicado el dictamen del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

DESCRIPCIÓN DEL AVE

Aspecto general

Ave del tamaño de un papamoscas cerrojillo con partes superiores pardo-rojizas e inferiores blancuzcas con tintes crema (foto 1). Destaca la cola negra con franjas laterales blancas tipo "collalba" (foto 2), pero con obispillo y supracoberteras caudales de color negro. El ejemplar capturado presenta una franja alar formada por la punta de las coberteras mayores y el borde de las terciarias (foto 3), característico del plumaje de primer invierno en esta especie.

La cabeza es redondeada, con ojos grandes y vivos, que le confiere "expresión de petirrojo", pero con el pico más corto y robusto, negro y con la base de la mandíbula más clara, con tinte color carne. Destacan unas llamativas vibrisas. El ojo es marrón oscuro, con anillo orbital negro y anillo ocular claro, color crema. Las patas son negras con las plantas amarillas.

Las partes superiores son de color homogéneamente marrón con un tinte rojizo herrumbroso, excepto en



MIGUEL DOMÍNGUEZ

Foto 1. Papamoscas papirojo.

las coberteras supracaudales que son negras. La cola negra presenta amplias franjas laterales de blanco vivo, formadas por el tercio basal de las rectrices externas.

Las partes inferiores son claras, de fondo crema que se oscurece adquiriendo tinte anaranjado, sobre todo en el mentón y la garganta, insinuando una garganta anaranjada bordeada en la parte inferior por una tenue franja pectoral más oscura (foto 4).

Las alas son marrón oscuro, con una franja alar de color pardo herrumbroso formada por la punta de las coberteras mayores y el borde de las terciarias.

Fórmula alar

La longitud alar es de 68 mm. La punta del ala está formada por P3. Presenta emarginaciones en P3, P4 y P5.

MIGUEL DOMÍNGUEZ



Foto 2. Detalle de la cola.

MIGUEL DOMÍNGUEZ



Foto 3. Detalle del ala, donde se aprecia la extensión de la muda parcial.

MIGUEL DOMÍNGUEZ



Foto 4. Detalle de las partes inferiores.

Muda

El ejemplar capturado presenta signos de haber realizado una muda parcial, que afecta a plumaje corporal y algunas coberteras mayores del ala, manteniendo todo el plumaje de vuelo de la generación anterior. Este carácter es propio de aves en su primer año calendario, en el plumaje de primer invierno.

IDENTIFICACIÓN

Los rasgos distintivos del papamoscas papirrojo comprenden el diseño de la cola, las partes superiores de color principalmente pardo pálido, sin blanco en los lados de la cabeza ni negro en las partes inferiores. La longitud alar oscila entre 66 y 73 mm; con la primaria P2 de igual longitud en la silueta alar que P6, pudiendo oscilar entre P5 y P7 (Svensson, 1996).

Se han descrito dos subespecies, bastantes diferentes tanto morfológicamente como en el canto, por lo que bien podrían ser dos especies diferentes (Snow y Perrins, 1998):

- Subespecie *parva*: Distribuida por el este de Rusia, sur de los Urales, Cáucaso y norte de Irán. El plumaje de macho adulto con un extenso babero naranja sin banda pectoral cruzando el pecho en su borde

inferior. Las hembras y los juveniles presentan un tinte amarillento en partes inferiores, supracoberteras caudales raramente negras, y la mayor parte de la mandíbula inferior pálida de color pajizo o pardo amarillento.

- Subespecie *albicilla*: Distribuida por el este de Rusia, al norte de la nominal, y Siberia. El macho tiene el babero más restringido, bordeado inferiormente por una ancha banda gris ceniza. Las hembras y los juveniles con garganta de color más blanco-moreno, no blanco-crema, y pecho blanco parduzco, no ante-amarillento, como la nominal. Las supracoberteras caudales son invariablemente negras. Todo el pico bastante oscuro, con mandíbula inferior negra con un poco de pálido sólo en la base.

Aventurándonos con nuestro ejemplar, podría tratarse de un ejemplar en plumaje juvenil, posiblemente de macho de la subespecie *albicilla*.

BIBLIOGRAFÍA

- Snow, D. W. y Perrins, C. M. (eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise edition. Vol. 2.* Oxford University Press. Oxford.
- Svensson, L. 1996. *Guía de identificación de los passeriformes europeos.* SEO/BirdLife. Madrid.