

PRIMER ANILLAMIENTO CIENTÍFICO DE UN CORRELIMOS CULIBLANCO O DE BONAPARTE (*Calidris fuscicollis*) EN ESPAÑA

ANTONIO MIGUEL PÉREZ ORTIGOSA.*

Especie: *Calidris fuscicollis*

Edad: 5 (muda variable). Posee las coberteras primarias de un color gris más claro que el resto, denotando de esta manera un contraste con el resto del plumaje del ala (foto final).

Sexo: Desconocido.

Fecha: 24-02-2005.

Lugar de captura: Desembocadura del Río Vélez-MÁLAGA.


Hora de captura: 11:00 AM.

Anillador: Antonio Miguel Pérez Ortigosa.

Descripción: Parecido a un correlimos común pero con el obispillo blanco, característica que comparte sólo con el correlimos zarapitín. El tamaño está entre un correlimos común y un menudo. La forma del cuerpo es más alargada que las dos especies con las que se compara (común y menudo). Sus alas son más largas que el correlimos menudo y más o menos igual que las de un correlimos común. Pico recto pero con una ligera curvatura en el extremo distal. Posee la base de la mandíbula inferior más clara, el resto del pico de color negro. La unión del pico con la cabeza es distinta al resto de correlimos ya que hace como dos medias U. Partes superiores tirando a marrón-grisáceo con una cuña marrón oscuro tirando a negro en las plumas. Partes inferiores blancas. Pecho grisáceo con manchas más oscuras. Ceja distinguible gris blancuzca, con una mancha más oscura delante de los ojos. Coloración muy grisácea de medio cuerpo hacia arriba comparado con otros correlimos. Patas negras, más fuertes que las de un correlimos menudo, más cortas que las de un correlimos común, más o menos igual de fuertes que éste último. Rectrices internas más largas que el resto. Su comportamiento es semejante al correlimos menudo, en libertad y, además, se juntaba para alimentarse con bandos de menudos.

Medidas: Ala: 120 mm.

FOTOS DESCRIPTIVAS DEL *Calidris fuscicollis*:





Partes superiores tirando a marrón-grisáceo con una cuña marrón oscuro tirando a negro en las plumas.

Pecho grisáceo con listas pequeñas más oscuras.
Partes inferiores blancas.





Obispillo blanco

Rectrices internas más largas que el resto.



Patas negras, igual de fuertes que las de un correlimos común pero comparativamente más cortas.

FOTOS COMPARATIVAS CON OTRAS ESPECIES DE CORRELIMOS



Calidris fuscicollis



Calidris alpina



Calidris minuta



Calidris fuscicollis



Calidris alpina



Calidris minuta



Calidris fuscicollis



Calidris alpina



Calidris fuscicollis capturado: Edad 5. Aunque poseen mudas variables este individuo posee contraste entre un grupo de pequeñas coberteras situadas sobre las coberteras primarias y el resto de plumas del ala demostrándose así su edad 5 (joven).

