









Hembras de Gorrión Común y Moruno (*Passer domesticus* y *P. hispaniolensis*).

Presentamos el aspecto de dos ejemplares aislados de Gorrión Común (columna de la izquierda) y Gorrión Moruno (columna de la derecha). En casos complicados como éste no se pueden hacer comparaciones en base a dos únicos individuos. Se necesitan amplias series de aves para conocer las diferencias de aspecto (al margen de la biometría). No obstante, creemos de interés mostrar estas fotografías, donde se puede ver que el pico de ambas aves difiere. El tamaño de una mandíbula con respecto de la otra y la forma de la unión de ambas aparecen diferentes, aunque esta estructura puede ser variable a nivel individual.

Gorrión Común (<i>Passer domesticus</i>)	Gorrión Moruno (<i>Paser hispaniolensis</i>)
	
	

Gorrión Común (<i>Passer domesticus</i>)	Gorrión Moruno (<i>Passer hispaniolensis</i>)
	
	

La diferencia de coloración de las grandes coberteras del ala merece estudiarse, pues ambas aves, aparentemente ya han realizado la muda completa.

El Gorrión Común fue anillado en la Vega de Granada el 17 de octubre y el Moruno en la Vega de Málaga el 14 de octubre, ambos en 2009.

Aunque nuestras capturas de Gorrión Moruno son escasas, intentaremos seguir reuniendo material para ofrecer una comparación más válida.

Texto y fotos: José A. Cortés (Grupo de Anillamiento SEO-Málaga)