

Gaviota sombría (*Larus fuscus graellsii*) Metálica: 6109480 / X:05 .



Ave en su tercer año calendario (7 EURING) que presenta caracteres de la subespecie *Larus fuscus graellsii* con plumaje de 3º invierno.

**9 de diciembre de 2009**

Fue encontrada por Salvador García en la playa de la Malagueta (Málaga) intoxicada por una toxina que le producía parálisis en patas y alas.

**24 de diciembre de 2009**

Tras dieciséis días de cuidados se libera en el puerto de Málaga recuperada completamente.

**4 de enero de 2010**

Es observada por Salvador García y Hannu Koskinnen en el puerto de Málaga.



**19 de marzo de 2010**

Es observada por Paul Veron en una de las islas del Canal de la Mancha. Guernsey, en vertedero de la playa Chouet, Reino Unido ( 49 30 24N 02 32 27W) a 1430 kilometros de distancia del lugar de liberación.



**8 de abril 2010**

Paul Veron vuelve a observar esta ave en el vertedero de la playa de Chouet, Guernsey (Reino Unido), por lo que piensa que esta gaviota parece realmente de la población reproductora de Guernsey.

**10 de abril 2010**

Paul Veron vuelve a observar esta ave alimentándose en el vertedero de Chouet, Guernsey (Reino Unido).



**21 de abril 2010**

Paul Veron vuelve a observar esta ave alimentándose en el vertedero de Chouet, Guernsey (Reino Unido) por lo que este ave debe formar parte de la población que se reproduce en las islas del Canal de La Mancha.