

Gaviota sombría (*Larus fuscus graellsii*) Metálica: 6109463 / X:01 .



Ave al menos en su cuarto año calendario (8 EURING) que presenta caracteres de la subespecie *Larus fuscus graellsii* con plumaje de adulto.

**1 de noviembre de 2009**

Fue encontrada por Salvador García en la playa de Benjarafe (Vélez-Málaga) intoxicada por una toxina que le producía parálisis.

**15 de noviembre de 2009**

Tras 15 días de cuidados se libera en el puerto de Málaga completamente recuperada como se puede ver en las siguientes fotos.



**1 de diciembre de 2009**

Fue observada por Dave Murray en la playa de la Carihuela, Torremolinos (Málaga).

**8 de diciembre de 2009**

Observada por Salvador García en el puerto de Málaga junto a otras gaviotas sombrías.

**7 de abril 2010**

Fue observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido (51.51 N 2.16 W) a 1.700 kilómetros de distancia del lugar de liberación.

**7 de mayo 2010**

Vuelve a ser observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.

**20 de mayo 2010**

Vuelve a ser observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.

**8 de junio 2010**

Fue observada por John Sanders en el vertedero de Cleeve (Cheltenham), Reino Unido (51.56N 2.05W).

**24 de junio 2010**

Fue observada por John Sanders en el vertedero de Stoke Orchard (Cheltenham), Reino Unido (51.56N 2.06W).

**12 de julio 2010**

Vuelve a ser observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.

**21 de julio 2010**

Vuelve a ser observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.

**11 de agosto 2010**

Vuelve a ser observada por John Sanders en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.

**29 de marzo de 2011**

Es observada por Gordon Avery en el vertedero de Gloucester, Reino Unido.