

# CAPTURA Y ANILLAMIENTO DE CAMACHUELO CARMINOSO EN MÁLAGA

José A. Cortés (SEO-Málaga, Málaga)

**C**UANDO me puse a redactar esta nota me planteé si hacerla formal o bien de un modo personal, coloquial y distendido. Me decidí por esta segunda opción pensando que quizá muchos anilladores reconocerán como propias algunas de las impresiones, expectativas y experiencias en el campo que se describen en el texto.

Día 12 de septiembre de 2001. Villanueva del Rosario (Málaga). 800 m.s.n.m. Arroyo al pie de la vertiente norte del macizo calcáreo integrado por las sierras de Camarolos y el Jobo. Agua y abundantes frutos silvestres (higos, moras y endrinos principalmente). Buena cobertura vegetal de árboles y arbustos.

La jornada de anillamiento iba encaminada a la captura de migradores, principalmente Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*), algún que otro Mosquitero (*Phylloscopus* spp.; Musical, Ibérico o Papialbo, que los tres se daban en esa fecha) y esperando alguna que otra sorpresa, en la forma de cualquier migrador más o menos interesante. No obstante, sabía que iban a entrar también muchas aves locales, aves que bajan de la sierra a beber en el arroyo: escribanos montesinos (*Emberiza cia*) y algunos soteños (*E. cirilus*), también posiblemente, los fringílidos más comunes (pinzones vulgares *Fringilla coelebs*, jilgueros *Carduelis carduelis*, verderones comunes *C. chloris*,



Joven de Camachuelo Carminoso (*EURING 3*) capturado para anillamiento el 12 de septiembre de 2001 en Málaga.

y páridos (carboneros comunes *Parus major* y herrerillos comunes *P. caeruleus*). Después de colocar cuatro redes, la mañana estuvo animada. Entraron las especies esperadas, algunos carriceros bien cargados de grasa y algún Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*).

En una de las vueltas, y siguiendo una costumbre inevitable, di un repaso a todas las redes, para sacar antes las aves para mí más interesantes (no sienta bien que escape de la red un papamoscas mientras uno desenreda un gorrión). A distancia y por encima, vi el panorama. Varios pájaros, casi todos escribanos, en la primera red, un joven Verderón descolorido en la segunda y algo más interesante en las

otras. En las dos últimas, entre otras aves, aparecían sendos machos de Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*) de lo más llamativo. Por ahí empecé la extracción. Dejé para el final al Verderón.

Conforme me acercaba a esta última red vi que había algo que no estaba en su sitio. Ese Verderón no tenía nada verde. Ya más cerca, una buena sorpresa. ¿Qué era esto que tenía delante? Parecía una mezcla de varias especies. Le di un rápido repaso a su aspecto general y lo guardé inmediatamente en el colector. Bien apartado de los demás. Seguí anillando y sacando aves un rato más... Y pensando. Por supuesto, no era nada que yo hubiese tenido antes en



José A. Cortés

Joven de Camachuelo Carminoso (EURING 3) capturado para anillamiento el 12 de septiembre de 2001 en Málaga.

mis manos, y ya han pasado por ellas unos cuantos miles de aves de muchas especies.

El cuerpo es como el de un Verderón Común joven (rayado en el pecho incluido) sin verde, pero la cabeza parece la de un gran Verdecillo Común, también sin verde. El pico es raro. Aunque se parece al del Verdecillo tiene un abombamiento muy peculiar. ¿Y esas dos franjas alares tan llamativas? También el cuerpo es algo más estilizado que el del Verderón. Tengo que mirar la guía de aves y también la Svensson para comprobar algunos detalles. Recuerdo que hace unos años ya se capturó en Málaga un Camachuelo Carminoso (*Carpodacus erythrinus*), y esto tiene toda la pinta de serlo también. Pero mejor no precipitarse. Ojeada a la guía. Lectura detallada de la Svens-

son y ahora, con más tranquilidad, sin otras aves ya en los colectores, vuelta a sacar el pájaro. Todo coincide. Las partes superiores pardo grisáceo, tenuemente listadas de oscuro (obispillo incluido). Las inferiores, blanco sucio finamente rayadas. Dos franjas alares blanco sucio. Coloración uniforme en la cola. Patas oscuras... Sí. Todo coincide. El plumaje es totalmente nuevo, luego se trata de un ave joven (código EURING 3). Los adultos lo tienen muy gastado por estas fechas. El sexo de un ave joven no se puede determinar, al menos no con la información de que dispongo. ¿Y ahora? Ahora viene lo malo, la descripción para el Comité de Rarezas. Este trámite me resulta tedioso. Pero bueno... Ahí está. Un Camachuelo Carminoso en Málaga. Seguro que a alguien le interesa.

## PETICIÓN DE INFORMACIÓN: ANILLAMIENTO DE AVOCETA COMÚN EN CÁDIZ

**C**UANDO Desde el año 2000 el Grupo Ornitológico del Sur (GOSUR) viene realizando anillamientos de Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*) en la bahía de Cádiz. El progresivo e imparable abandono de las salinas, hábitat fundamental para su desarrollo biológico, viene provocando una fuerte disminución en el número de parejas reproductoras. Para su mayor conocimiento se están marcando con anillas metálicas del Ministerio de Medio Ambiente en la pata derecha y negras con dígitos alfanuméricos en blanco en la pata izquierda, para facilitar su seguimiento. Se agradecerá la lectura de estas u otras anillas de esta especie.

Contacto: José M<sup>o</sup> Fernández Zapata (GOSUR)  
C/ Galaxia 11. 11510 Puerto Real (Cádiz)  
socratesff@wanadoo.es



José Luis Sánchez Niebla